

**FICHA TÉCNICA****Bio Humus**  
líquido**CARACTERISTICAS**

Materia orgánica líquida concentrada y humidificada que contiene sustancias húmicas derivadas de la leonardita. Bio – hùmus mejora el suelo física, química y biológicamente, se puede aplicar con fertilizantes sólidos o líquidos.

**GARANTIA DE COMPOSICION**

Ácidos húmicos	28%
Nitrógeno	20%
Fósforo	10%
Potasio	10%
C.b.p.	32%
Total.	100%

**EFECTOS**

- Facilita la asimilación de nutrientes.
- Retiene la humedad en el suelo.
- Alto poder de quelatación de cationes.
- Evita grietas y asfixia de raíces.
- Mejora la aeración y porosidad del suelo.
- Mejora la salinidad del suelo.
- Reduce la compactación del suelo.
- Fija el amoniaco disminuyendo la pérdida de nitrógeno.
- Eficaz y rápida nutrición.
- Estimula el crecimiento radicular.
- Mayor y mejor crecimiento vegetativo.
- Mejora el tamaño, número y peso de frutos.
- Mejores cosechas con calidad.



**APLICACIÓN Y DOSIFICACION**

GRUPO Y CULTIVO	FORMAS DE APLICACION		
	FOLIAR	EPOCA	AL SUELO
	LT/HA.		LT/HA.
CEREALES: Maíz, Cebada, Arroz, Sorgo, Avena, Trigo, Centeno y Amaranto.	1	15 días después de siembra.	2
	1	30 días después de la siembra.	5
LEGUMINOSAS: Frijol, Alverjón, Frijol de soya, Haba, Alverja, Cacahuete y Alubia.	1	Inicio de floración.	2
	1	Amarre de vainas.	5
HORTALIZAS: Ajo, Apio, Betabel, Cebolla, Col, Chile, Chicharos, Coliflor, Ejotes, Pepino, Espinacas, Jitomate, Lechuga, Pimiento morrón, Tomate, Rábano, Cilantro, Chayote, Esparrago, Brócoli, Acelga, Zanahoria, Perejil y Calabacitas.	1	20 días después de emerger.	2
	15	Inicio de floración.	5
	2	Amarre de frutos.	5
INDUSTRIALES: Caña de azúcar.	1	15 días después de la siembra o del corte (socas y resocas)	8
	2	30 días después de la primera aplicación.	4
FIBRAS: Algodón, Lino, Yute y Henequén.	1	Inicio de floración	2
	1	Amarre de la bellota.	5
OLEAGINOSAS: Soya, Girasol, Cacahuete, Coco, Palma aceitera, Canola y Colsa.	1	Inicio de floración	2
	1	30 días después de la primera aplicación.	5



Hoja tres.

TUBERCULOS: Yucca, Camote, Papa y Remolacha.	1	Después de emerger.	2
	1	30 días después de la primera aplicación.	5
ESTIMULANTES: Cacao, Café, Té y Tabaco.	1	Inicio de floración.	2
	1	Amarre de frutos.	5
FRUTALES Y VIVEROS: Naranja, Uva, Piña, Lichi, Toronja, Durazno, Tejocote, Limón, Manzana, Chabacano, Papaya, Nuez, Cereza, Ciruela, Zarzamora, Melón, Sandía, Plátano, Mango y Fresa.	1	Brotos nuevos.	2
	1	8 días antes de la floración.	4
	1	Amarre de frutos.	4
FORRAJES: Alfalfa, Maíz, Sorgo, Pastos, Bermuda, Orchard, Trébol, Thimoy, Sudan.	1	Después de cada corte.	5

